Lane Medical Library
1920

AUS DEM ZAHNÄRZTLICHEN INSTITUT DER UNIVERSITÄT HALLE
DIREKTOR: GEH. RAT PROF. DR. KOERNER

Über Unterkieferschußfrakturen mit Kontinuitätstrennung ohne Störung der Artikulation

AUSZUG

AUS DER

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS
DER ZAHNHEILKUNDE

DER

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT

DER

VEREINIGTEN FRIEDRICHS-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG

VORGELEGT

VON

HERMANN HENZE
ZAHNARZT IN HALLE (SAALE)

REFERENT: GEH. RAT PROF. DR. KOERNER

HALLE (SAALE)
DRUCK VON KARRAS, KRÖBER & NIETSCHMANN
1920

Unterkieferschußfrakturen mit Kontinuitätstrennung ohne Störung der Artikulation sind in der Literatur sehr wenig beschrieben worden. Misch und Rumpel erwähnen einen solchen Fall, und bei Warneros finden wir ein Röntgenbild eines gleichen Falles.

Von 12 im Kieferlazarett Halle (Saale) selbst beobachteten Fällen, deren gekürzte Krankengeschichten der Dissertation beigefügt sind, seien hier kurz die Röntgenbefunde aufgeführt: 1. Fall: Bruch des Proc. condyloideus links. 2. Fall: Bruch des linken aufsteigenden Unterkieferastes. 3. Fall: Querfraktur und Längsfraktur des aufsteigenden rechten Unterkieferastes. 4. Fall: Fraktur durch den rechten aufsteigenden Unterkieferast mit Absprengung des Kronenfortsatzes und Verlust eines Stückes der vorderen Kante des aufsteigenden Astes. 5. Fall: Fraktur im linken Kieferwinkel. 6. Fall: Fraktur des Unterkiefers links im Kieferwinkel; der aufsteigende Ast, von dessen vorderer Kante die untere Hälfte in Verlust geraten ist, ist dabei in typischer Weise etwas gehoben und nach innen gedreht. 7. Fall: Ausgedehnte Kieferfraktur an der Stelle des 2. unteren linken Molaren. 8. Fall: Fraktur des rechten Unterkiefers zwischen 2. und 3. Molaren mit großer Splitterung des Kieferkörpers in der Gegend des 3. Molaren. 9. Fall: Zwei Bruchlinien im rechten Unterkiefer vor dem 2. Molaren. 10. Fall: Fraktur des rechten Unterkiefers in der Gegend des 1. Molaren. 11. Fall: Ausgedehnte Fraktur des linken Unterkiefers, welche kurz vor dem Kieferwinkel beginnt, wo die basis mandibulae in einer größeren Ausdehnung zertrümmert ist, und dann durch den Kieferkörper vor dem 1. Molaren verläuft. 12. Fall: Ausgedehnte Splitterfraktur des linken Unterkiefers in der Gegend der Prämolaren.

Von den angeführten Fällen können Fall 1 bis 5 zusammengefaßt werden, bei denen die Fraktur im Bereich des